

راهنمای احیا در بیماران مبتلا به COVID-19

تهیه و تنظیم:

دکتر محمد رضا بای، دکتر سمیه براتی، دکتر خزر گرجانی، دکتر پویا پاینده مهر، دکتر ضیا توتونچی، دکتر محمد اسماعیل زنگنه، دکتر وحید اخوندی، دکتر پرهاشم صادقی پور، دکتر احمد امین، دکتر امیر محمد جوادی

نسخه نخست
۱۶ فروردین

۱۳۹۹

مرورگران:

دکتر فریدون نوحی، دکتر مجید کیاور، دکتر مجید ملکی، دکتر سید محمد مهدی پیغمبری، دکتر محمد جلیلی، دکتر مجید حق جو، دکتر علیرضا ماهوری، دکتر عبدالحسین طباطبائی

انجمن قلب و عروق ایران

۹۹ فروردین

راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID-19

ضرورت

مراقبت‌های حوزه سلامت در هنگام همه‌گیری عفونی، دشوارتر و نیازمند ملاحظات دقیق‌تری است. برخی اقدامات معمول برای احیای قلبی - ریوی^{*} (CPR) با نام فرآیندهای ایجاد کننده آئروسل[†] شناخته شده و از جمله پرخطرترین فرآیندهای منتقال دهنده COVID-19 به کادر درمان و محیط می‌باشند. درمان افراد نیازمند احیا (CPR) و هم‌زمان محافظت از ایشان در برابر عفونت جاری، به همراه پیشگیری از سرایت عفونت به بیماران دیگر، همراهان، و کادر درمان، مجموعه دقیقی از پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌ها را طلب می‌کند.

هدف

راهنمایی زیر برای آگاهی کادر مراکز درمانی از آمادگی‌های مورد نیاز پیش از احیا، و ملاحظات ضروری هنگام احیا و پس از آن - تا پایان دوران همه‌گیری COVID-19 - تنظیم شده است. راهنمایی شماره ۱ به عنوان ضمیمه‌ای بر دستورالعمل استاندارد CPR، به اجرای هرچه ایمن‌تر فرآیند احیا توسط کلیه پرسنل سلامت کمک می‌کند؛ و راهنمایی شماره ۲ حاوی نکاتی درباره انتوباسیون ایمن‌تر است و برای متخصصان و دستیاران و تکنسین‌های رشتة تخصصی بیهوشی مدون شده است.

مخاطب

توصیه می‌شود تمام کادر مرکز درمانی که به نحو مستقیم (پزشکان، پرستاران، ...) یا غیرمستقیم (کمکبهیاران، پرسنل خدمات، انتظامات، مسئول فی، کمیته کنترل عفونت، ...) در فرآیند احیا و اقدامات پس از آن دخالت دارند در جریان این راهنمای قرار داشته باشند. با آشنایی طیف گسترده همکاران از اهمیت مراقبت‌های ویژه دوران همه‌گیری، تغییرات ویژه این دوره با سرعت و دقت بیشتری عملی خواهند شد.

موارد استفاده

- کلیه بیماران با تابلوی ایست قلبی-تنفسی در اورژانس‌های بیمارستانی، مورد مشکوک در نظر گرفته شوند و برای احیای ایشان این راهنما مبنای عمل باشد.
- کلیه بیماران با تابلوی ایست قلبی-تنفسی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاه‌ها و ... مورد مشکوک در نظر گرفته شوند و برای احیای ایشان این راهنما مبنای عمل باشد.
- کلیه بیماران نیازمند احیا در بخش‌های بستری مختص بیماران مشکوک یا مبتلا به COVID-19 مطابق این راهنما احیا شوند.
- کلیه بیماران نیازمند احیا و دارای علائم مشکوک به عفونت COVID-19 در سایر بخش‌های بستری مطابق این راهنما احیا شوند

* Cardiopulmonary Resuscitation

[†] Aerosol Generating Procedures (AGP)

پیشنهادهای تکمیلی

- توصیه می شود مراکز مختلف به فرآخور تجهیزات و منابع انسانی خود، حداکثر اصول این راهنمای را اجرا نمایند.
- توصیه می شود مسئولین مراکز، آموزش این راهنمای و سایر راهنمایها و دستورالعملهای ضروری به پرسنل را به طریق مناسب مد نظر قرار داده و جدول اصلی این راهنمای در اندازه مناسب پیش چشم همکاران دخیل در فرآیند احیا نصب شود.
- در صورت داشتن تجربه قبلی پرسنل درمانی و وجود شرایط مناسب، به منظور کاهش ریسک انتشار آثروسیل، می توان از روش احیایی کمتر متداول «*Prone CPR*» استفاده کرد. در این روش بیمار در وضعیت *Prone* قرار داده شده و ماساژ قفسه سینه روی بخش میانی مهره های توراسیک (حدود T_7) و بین دو اسکاپولا انجام می شود. برای افزایش اثربخشی این روش، بهتر است بین قفسه سینه بیمار و تشک تخت، صفحه محکمی (مثلایک تخته، یا دست یک همکار) قرار گیرد. در صورت نیاز به دفیبریلاسیون، یکی از پدها در خط میداگزیلاری چپ و دیگری روی اسکاپولا راست قرار می گیرند.

سایر راهنمایهای ضروری

- توصیه می شود در کنار این راهنمای، موارد زیر نیز در مراکز در دسترس کادر درمانی بوده و آموزش های لازم برنامه ریزی شود:
- راهنمای استاندارد CPR
 - راهنمای آموزشی پوشیدن و خارج کردن تجهیزات ایمنی فردی
 - راهنمای آموزشی شستشوی دستها

منابع

- 1) World Health Organization. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic prone acute respiratory infections in health care. WHO guidelines.
[https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/\(2014\)](https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/(2014))
- 2) World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Commission on Coronavirus disease 2019. 2020. World Health Organization.
- 3) Resuscitation Council UK Statement on COVID-19 in relation to CPR and resuscitation in healthcare settings, Version 2. Published 24 March 2020.
<https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/covid-healthcare/>
- 4) William A. Rutala, Ph.D., M.P.H.1,2, David J. Weber, M.D., M.P.H.1,2, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)3: Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 Update: May 2019;
<https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection>
- 5) Public Health England.COVID-19: Guidance for infection prevention and control in healthcare settings. Version 1.0.
- 6) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/874316/Infection_prevention_and_control_guidance_for_pandemic_coronavirus
- 7) AHA Guidance for CPR, Emergency CV Care Amid COVID-19 – Medscape – Mar 23, 2020

راهنمای شماره ۱. احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID-19

در هر بخش (خصوصا در اورژانس) ترجیحاً یک اتاق یا محدوده مجزایی را جهت انجام CPR اختصاص دهید و از احیا در سایر فضاهای پر همیزید.

۱

همراهن بیمار و سایر مراجعان را تا پایان احیا و پس از آن، از محدوده اتاق یا فضای اختصاص داده شده برای CPR دور نگه دارید.

۲

برای انجام CPR، از حداقل نیروی انسانی ممکن استفاده نمایید توصیه می‌شود علاوه بر پزشک مسئول تیم احیا و مسئول راه هوایی (غالباً تکنسین)، رزیدنت یا متخصص بیهوشی، در صورت امکان یک پزشک دیگر و دو پرستار (حداقل ۴ و حداقل ۵ نفر) در فرآیند احیا شرکت نمایند. از حضور پرسنل بیش از این تعداد پرهیز شود. حتی الامکان از پرسنل کم تجربه – نظیر دانشجویان – در تیم CPR کمتر استفاده شود.

۳

پزشک مسئول تیم CPR، پیش از پیوستن به فرآیند احیا – از همراهن و پرونده قبلی – اطلاعات ضروری را اخذ نماید. به این ترتیب پس از ورود به فرآیند احیا، از رفت و آمد غیرضروری به خارج از محدوده CPR خودداری خواهد شد.

۴

پیش از پوشیدن تجهیزات ایمنی فردی (PPE)[#]، تلفن همراه، مهر و هر وسیله دیگری که ممکن است تا پایان فرآیند CPR به آن نیاز داشته باشید را از جیب لباس فرم خود خارج کنید. به این ترتیب تا پایان عملیات احیا، از تماس دستها با لباس فرم (جیبها و ...) پرهیز نمایید.

۵

بسته کامل PPE را از محل تعیین شده در بخش خود بردارید. پیش از شروع CPR آن را پوشید. این بسته می‌بایست حداقل شامل مواد زیر باشد: گان جراحی بلند یا گان یکسره ضدآب، دو جفت دستکش، یک عدد ماسک FFP3 یا FFP2 یا N95 یا کلاه، عینک یا شیلد صورت، و یک جفت روکفشی باشد. هرگز پیش از مجهز شدن به پوشش فوق، CPR را شروع نکنید. این کار ممکن است شروع پروسه احیا را اندکی به تأخیر بیندازد؛ با این حال حفظ ایمنی اعضای تیم درمان در اولویت است. با آماده‌سازی بسته‌های PPE به تعداد کافی در محل معرفی شده به پرسنل (مثلًا ترالی اورژانس) می‌توانید تأخیر احیا را به حداقل برسانید.

۶

انتوپاسیون باید فقط توسط فرد آموزش دیده و متبحر (مسئول راه هوایی) – و در صورت امکان با کمک ویدیولارنگوسکوپ – انجام شود. پیش از حضور مسئول راه هوایی – چنانچه حمایت تنفسی ضروری است – از ماسک و آمبوبگ فقط به صورت passive fixation استفاده کنید. به این معنی که بدون انجام ونتیلاسیون و آمبوزدن، ماسک را روی صورت بیمار فیکس نگه دارید و اکسیژن بدهید.

۷

با توجه به خطر انتشار عفونت حین استفاده از آمبوبگ، حتی المقدور احیا فقط با ماساژ قفسه سینه – و در صورت نیاز دفیریلاسیون – انجام شود (Chest Compression Only CPR). با این حال هنگام chest compression حتی در صورت کفایت عملکرد تنفسی، روی صورت بیمار ماسک اکسیژن فیکس شده باشد تا احتمال انتشار aerosol به حداقل برسد. اگر Automated Chest Compressor در دسترس دارید، برای chest compression از آن استفاده کنید.

۸

در صورت نیاز به سمع ریه و قلب، فقط از استتیسکوپی استفاده کنید که از قبل برای موارد مشکوک یا مبتلا معین شده است. پس از اتمام CPR آن را در کنار سایر وسایل نیازمند ضد عفونی قرار دهید. از استفاده از استتیسکوپ‌های شخصی پرهیزید.

۹

هنگام انجام CPR و پس از آن، تجهیزات آلوده خصوصاً به ترشحات تنفسی (مانند لارنگوسکوپ، ماسک بیمار، ...) را در سینی یا ظرف از پیش معین شده‌ای بگذارید و بر بالین بیمار قرار ندهید.

۱۰

پس از ختم CPR، ضروری است کلیه تجهیزات قابل استفاده مجدد – از جمله لارنگوسکوپ، استتیسکوپ، ... – مطابق پروتکل کمیته کنترل عفونت بیمارستان ضد عفونی و استریل شوند. همچنین کلیه لوازم مصرفی غیرقابل استفاده مجدد – از جمله چست لید، لوله تراشه و ... – نیز می‌بایست به عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته شده و در سطل مخصوص زباله‌های عفونی دفع شوند.

۱۱

پس از ختم CPR، کلیه تجهیزات ایمنی فردی را طبق پروتکل مربوطه خارج نمایید و در نزدیکترین سطل مخصوص زباله‌های عفونی (زرد رنگ) بیندازید. به هیچ عنوان پس از ختم CPR با تجهیزات پوشش فردی در سایر قسمت‌های بخش رفت و آمد نکنید.

۱۲

پس از خارج کردن PPE دستهای خود را به شیوه صحیح با آب و صابون بشویید و در صورت عدم دسترسی، با محلولهای الکلی، ضد عفونی نمایید.

۱۳

پس از پایان CPR – اعم از موفق یا ناموفق – برای بررسی ضرورت ارسال نمونه COVID-19، نحوه جابجایی بیمار یا متوفی، و سایر اقدامات ضروری مربوط به درمان یا کنترل عفونت با پزشک مسئول (متخصص عفونی، داخلی، ...) و یا مسئول کنترل عفونت بیمارستان تماس بگیرید.

۱۴

راهنمای شماره ۲. نکات ویژه انتوباسیون برای متخصصین بیهوشی

حتی الامکان از اینتوباسیون حین هوشیاری بیمار پرهیز نمایید. فراموش نکنید که Atomized local anesthetic ممکن است موجب پخش اثروسل گردد. در صورت امکان از glidescope و یا وسایل مشابه استفاده نمایید.

۱

در موارد pre-arrest از استراتژی rapid sequence induction (RSI) جهت القای بیهوشی کمک بگیرید این اقدام توسط یک پزشک با تجربه و ماهر باید انجام شود. در صورت هیپوکسی شدید، عدم تحمل اپنه برای ۳۰ ثانیه و یا کنتراندیکاسیون در استفاده از فلچ کننده های عصبی-عضلانی، RSI باید بر اساس شرایط بیمار تغییر نماید. در صورت استفاده از ونتیلاسیون دستی، از حجم جاری (Tidal Volume) کم استفاده نمایید.

۲

بهتر است از ۵ دقیقه پره اکسیژناتیون (preoxygenation) با اکسیژن ۱۰۰ درصد و به دنبال آن RSI استفاده شود تا از حتی المقصور از ونتیلاسیون دستی اجتناب گردد. ونتیلاسیون دستی بالقوه میتواند موجب پخش اثروسل گردد.

۳

طمئن شوید که یک فیلتر هیدروفوبیک با کارایی بالا (high efficiency hydrophobic filter) بین ماسک صورت و مسیر تنفسی و یا ماسک تنفسی یا امبوبگ (manend Laerdal bag) قرار گیرد.

۴