



سطح بندی خدمات پری ناتال

لایکسیون مرالبت در نظم سطح بندی خدمت پری ناتال

محدوده سطح ۱ ارائه خدمت

- مادر سالم با بار بارداری بد و ن عارضه
- سابقه سزارین با چک محل جفت (در صورت اکرتا یا اینکرتا ارجاع به سطح 3)
- سابقه poor outcome pregnancy (پس از مشاوره با سطح 3)
- مادر تهدید به سقط
- سابقه سقط راجعه (مشاوره با سطح 3)
- نمایش غیر طبیعی
- مادر با آتمی خفیف، متوسط
- قد زیر 150 سانتیمتر
- مادر زیر 18 سال
- سابقه زایمان سخت یا سریع
- سابقه آتوتی
- رحم میوئوتو
- سابقه یک بار دکلمان
- هیپوتیروییدی کنترل شده
- نماییه توده بنی کمتر از ۳۰
- سابقه IUFD یا نوزاد ناهنجار با مشاوره سطح 3
- ناهنجاری رحمی (پس از مشاوره با سطح 3)
- سابقه IUGR (مشاوره با سطح 3)
- سابقه پره ترم (مشاوره با سطح 3)

مراقبت های بارداری PNC

اندیکاسیونهای بستری مادر در زمان بارداری

اندیکاسیونهای بستری مادر جهت زایمان و پس از زایمان

محدوده سطح ۲ ارائه خدمت

- کلیه اندیکاسیونهای سطح 1
- فشار خون مزمن بدون End Organ Damage با کنترل مناسب دارویی
- پره اکلامپسی یا سابقه آن بالای 34 هفته (در موارد زیر 34 هفته پس از مشاوره با سطح 3)
- سابقه پره اکلامپسی شدید (مشاوره با سطح 3)
- سابقه سقط مکرر و زایمان زودرس (مشاوره با سطح 3)
- انواع دیلبت (به شرط عدم وجود End Organ Damage) در صورت امکان ارجاع به سطح 3
- آتمی شدید مادر (مشاوره با سطح 3) $Hb > 7$
- بیماریهای قلبی moderate risk و low risk (در صورت وجود کاردیولوژیست)
- بیماریهای زمینه ای مادر (کلیوی، خونی، ...) (مشاوره با سطح 3)
- دوقلونی بدون عارضه
- جفت سر راهی
- پلی هیدرامنیوس و الیگو هیدرامنیوس (مشاوره با سطح 3)
- سابقه دو بار یا بیشتر دکلمان (کنترل تا 28 هفته بارداری)
- هیپرتیروییدی کنترل شده
- > 35 نماییه توده بنی > 40
- post date
- ابتلاء به TORCH (مشاوره با سطح 3)
- صرع
- مادر معاد (مشاوره با سطح 3)
- زایمان زودرس کنترل شده
- اسم

محدوده سطح ۳ ارائه خدمت

- کلیه اندیکاسیونهای سطح ۲
- فشار خون مزمن کنترل نشده و یا End organ damage
- مننژیت با کاهش هوشیاری
- آمبولی ریه پس از تثبیت وضعیت مادر
- پره ترم کمتر از ۳۲ هفته یا IUGR شدید
- سابقه دیلبت طولانی مدت
- بیماری نارسایی عضوی همراه با بارداری
- بیماری قلبی شدید
- بیماری نارسایی کلیه
- دو قلویی با مشکل چند قلویی
- بیماری های اتو ایمیون (میاستنی گراو....)
- سابقه کبد چرب بارداری
- سابقه دو بار یا بیشتر دکلمان (کنترل از هفته ۲۸ بارداری)
- بیماری هیپر تیروییدی و هیپوتیروییدی کنترل نشده
- نماییه توده بدی ≤ 40
- جنین ناهنجار با قابلیت حیات
- اسم کنترل نشده و هر نوع بیماری ریوی

- کلیه اندیکاسیونهای سطح ۲
- اختلال هوشیاری - تشنج
- کوریو آمنیوتیت
- مننژیت با کاهش هوشیاری
- IUGR شدید با پره ترم
- ناهنجاری Viable
- Twin to twin transfusion)TTS
- (syndrome) TRAP و Twin Reversed Arterial Perfusion جریان خون معکوس در دوقلویی
- سابقه کاربوی میو پتی در طی یا بعد از بارداری
- فقدان یا معکوس شدن جریان پلایان نیا ستول
- قبل از ۳۳ هفته

- کلیه اندیکاسیونهای سطح ۲
- اختلال هوشیاری - تشنج
- کوریو آمنیوتیت و پارگی کیسه آب کمتر از ۳۲ هفته
- متریک توکمیک
- مننژیت با کاهش هوشیاری
- HELLP Syndrome
- کبد چرب بارداری و هپاتیت
- IUGR شدید یا پره ترم
- دکلمان به همراه مرگ داخل رحمی - DIC یا نارسایی کلیه
- $BMI > 40$
- زایمان TTS و Trap
- پره اکلامپسی کمتر از ۳۴ هفته که نیاز به ختم بارداری داشته باشد
- زایمان پره ترم کمتر از ۳۲ هفته یا وزن جنین کمتر از ۱۵۰۰ گرم
- جفت سرراهی اکرتا و اینکرتا (گرید ۳ و ۴ که در حال خونریزی فعال نیستند)
- $PROM \leftarrow 32w$
- سپسیس بعد از زایمان و در صورت عدم پاسخ به درمان تا ۴۸ ساعت

- کلیه اندیکاسیونهای سطح 1
- فشار خون مزمن
- پره اکلامپسی زیر 34 هفته پس از مشاوره با سطح 3
- پارگی کیسه آب بالای 32 هفته
- پیلو نفریت
- شکم حاد بارداری
- پره ترم بالای 32 هفته یا وزن جنین بالای 1800 گرم که دردهای زایمانی را بتوان مهار کرد
- پنومونی
- مننژیت
- FUO (Fever of unknown origin) تب بدون علت مشخص پزشکی
- بیماریهای زمینه ای مادر (کلیوی، خونی، ...)
- تهوع و استفراغ شدید کنترل نشده
- DVT
- انواع دیلبت در بارداری بدون نارسایی عضوی
- گلستاز بارداری
- آتمی شدید
- آمنیو ریداکشن (پس از مشاوره با سطح ۳)
- بیماریهای قلبی moderate risk و low risk (در صورت وجود کاردیولوژیست)

- کلیه اندیکاسیون های سطح 1
- جفت سر راهی
- دوقلونی بالای 32 هفته
- آمبولی ریه (تثبیت وضعیت مادر و ارجاع به سطح 3)
- پلی هید رامننیوس متوسط تا شدید و الیگو هیدرامنیوس
- IUGR ترم ، بالای 1000 گرم
- مادر معاد
- مادر تب دار
- زایمان پره ترم 32 هفته و بالاتر
- ایله مرغان حین زایمان
- مادر دیابتیک
- آتمی شدید
- ناهنجاری جنین بدون قابلیت حیات
- بیماریهای قلبی moderate risk و low risk (در صورت وجود کاردیولوژیست)
- IUFD
- DVT
- اکلامپسی بدون organ failure
- $PROM > 32w$
- سپسیس بعد از زایمان و پاسخ به درمان تا 48 ساعت

- تهوع و استفراغ شدید بارداری بدون اختلال متابولیکی
- مثبت HbsAg, HCV, HIV اگر نارسایی عضوی وجود ندارد
- مادر تب دار (پس از مشاوره با سطح ۳)

- موارد طبیعی
- نمایش غیر طبیعی
- دو قلویی ترم
- ناهنجاری کشنده در جنین
- پلی هیدرامنیوس خفیف، بدون ناهنجاری جنین در سونوگرافی
- ناهنجاری رحمی
- سابقه سزارین
- فاز فعال زایمان زیر 25 هفته
- زایمان اجتناب ناپذیر
- سابقه زایمان سخت یا سریع
- سابقه مول
- انجام زایمان مادری که سابقه مرده زایی با نوزاد ترم
- فنی سالم دارد (پس از مشاوره)
- سابقه نوزاد ناهنجار با نوزاد فنی سالم (پس از مشاوره)
- زایمان و آتمی خفیف و متوسط
- اورژانسهای مامایی در زمان زایمان مانند جفت سرراهی، دکلمان در صورت جنین زنده پادسرس تنفی
- زایمان بالای 36 هفته
- انواع سقط ها به جز سقط عفونی
- متریت پس از زایمان
- تعداد بارداری 4 و بالاتر
- سن بالای 16 و زیر 37 سال
- پره اکلامپسی (تثبیت وضعیت مادر و ارجاع به سطح ۲)
- سابقه دیلبت در بارداری ولی با BS نرمال در حاضر
- بیماری فشارخون مزمن ولی کنترل شده